

ОТРОВНЕ ДИВЉЕ ПЕЧУРКЕ



- > Опасне дивље печурке се обично појављују после прве добре јесење кише.
- > Могу се пронаћи на разним местима укључујући необрађене жбуновите пределе, у шумама, јавним парковима, на дечијим игралиштима, у школским двориштима, на пољопривредним земљиштима и у близини куће у вашој башти на травњаку, у ђубриву, малчу или слами.
- > Водите бригу о деци и кућним љубимцима када се налазите вани, зато што су печурке лако доступне и могу изгледати интересантне за јело.
- > Особе које су живеле у иностранству морају бити свесне да отровне печурке у Аустралији могу изгледати као јестиве печурке које се налазе у неким другим земљама.
- > Отровне печурке под именом Death cap (Капа смрти) су једне од најопаснијих и могу проузроковати фатално оштећење јетре. Кување или гуљење не отклања отров. Death cap (Капа смрти) печурке расту у близини храста, лешњака или кестена, али смртоносне печурке такође могу расти било где. Једине печурке безбедне за јело су оне које се купују у поузданим продавницама воћа и поврћа или у супермаркетима
- > Ако неко случајно поједе дивљу печурку, не чекајте да симптоми почну, назовите **Poisons Information Centre (Информативни центар о отровима)** на **13 11 26** и следите њихове савете.
Ако се неко разболи након што поједе дивље печурке треба хитно потражити медицинску помоћ.
У хитном случају увек назовите три нуле (000).

Симптоми тровања дивљим печуркама укључују:

- > Јаке стомачне грчеве
- > Болове у стомаку
- > Повраћање
- > Мучнину
- > Дијареју

Симптоми обично почну 3-6 сати након што сте појели печурке и моги трајати до 3 дана.

Најопасније печурке могу имати одложене симптоме који могу започети 24 сата након јела.

www.sahealth.sa.gov.au/mushroompoisoning

